Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Agroscope

swiss granum

Silomaissorten für die Ernte 2016

Geordnet nach der Frühreife innerhalb der Reifegruppe aufgrund des TS-Gehaltes der Pflanze zum Zeitpunkt der Ernte

Sortenname	Korntyp	Züchter	Aufnahmejahr	Trocken-substanz-ertrag	Verdau-lichkeit	Stärke-gehalt	Netto-Energie Laktation (NEL)	Reife (ganze Pflanze)	Jugendent-wicklung	Standfestigkeit			Resistenz[2]		Empf. Bestandes-dichte (Pfl./m²)
										Vegetation	bei Ernte	Stängelbruch bei Ernte	Beulenbrand	Helmintho-sporium Blattflecken[3]	
ANBAU NÖRDLICH DER ALPEN															
Sortiment früh (geeignet für Anbauzonen 1 bis 4) – FAO 190-220															
P8057	H(z)	Pioneer	2013	++	+++	+++	++	+++	+	++	++	++	++	++	10,0
DKC 3333	H(z)	Monsanto	2014	++	++	++	++	+++	+	++	++	++	++	+	10,0
Schobbi CS	H(z)	Caussade	2014	++	+++	+++	++	+++	++	++	++	++	++	++	10,5
Spyci CS	**H(z)**	**Caussade**	**2016**	**++**	**+++**	**+++**	**++**	**++**	**+**	**++**	**++**	**++**	**++**	**(+)**	**10,0**
Lidano	H(z)	Saatbau Linz	2015	+	++	+	Ø	++	+	++	++	++	+	+	10,0
P7524	H(z)	Pioneer	2015	++	+	-	Ø	++	++	++	++	++	+	-	10,0
Cathy	H(z)	Advanta (LG)	2014	++	++	Ø	+	++	+	++	++	++	+	+	10,0
ES Cluedo	H(z)	Euralis	2015	++	+++	++	++	++	+	++	+	++	++	+	8,0
LG 30.222[1]	H(z)	Limagrain	2011	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	+	10,5
Fabregas	H(z)	KWS	2009	+	Ø	+	Ø	++	++	++	++	+	++	Ø	10,0
LG 31.211[1]	**H(z)**	**Limagrain**	**2016**	**+++**	**++**	**++**	**+**	**++**	**+**	**++**	**++**	**+**	**+**	**(Ø)**	**10,0**
Kompetens[1]	H(z)	KWS	2015	++	+++	+++	+++	++	+	++	++	++	++	++	10,0
SY Tribore	H	Syngenta	2015	+	++	++	+	+	+	++	++	++	++	+	10,5
Coditank	H(z)	Caussade	2015	++	++	++	++	+	+	++	+	++	++	+	10,5
SY Amboss	H(z)	Syngenta	2015	+++	+++	+++	+	+	+	++	+	++	+	Ø	9,0

[1] Als Köner- und Silomais geeignet.

[2] Die Kolonne mit der Information über Resistenz gegen Kopfbrand wurde gelöscht (keine Boniturresultate mehr verfügbar). Die neueren Sorten der Liste sind resistent gegen Kopfbrand und ältere, anfällige Sorten gelangen nur mit speziell gegen Kopfbrand gebeiztem Saatgut in de Handel.

[3] Siehe Erklärung Textteil Seite 2. (xy) = Werte aufgrund einjähriger Datengrundlage noch nicht definitiv.

Leere Zellen: Keine Wertefür eine Beurteilung verfügbar.
Korntyp: H = Hartmais; H(z) = hartmaisähnlicher Zwischentyp; Z = Zahnmais; Z(h) = zahnmaisähnlicher Zwischentyp.
Übrige Eigeschaften: +++ =sehr gut; ++ = gut; + = mittel bis gut; Ø = mittel; - = mittel bis schwach; -- = schwach; --- = sehr schwach/spät

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Agroscope

swiss granum

Silomaissorten für die Ernte 2016

Geordnet nach der Frühreife innerhalb der Reifegruppe aufgrund des TS-Gehaltes der Pflanze zum Zeitpunkt der Ernte

Sortenname	Korntyp	Züchter	Aufnahmejahr	Trocken-substanz-ertrag	Verdau-lichkeit	Stärke-gehalt	Netto-Energie Laktation (NEL)	Reife (ganze Pflanze)	Jugendent-wicklung	Standfestigkeit			Resistenz[2]		Empf. Bestandes-dichte (Pfl./m²)
										Vegetation	bei Ernte	Stängelbruch bei Ernte	Beulenbrand	Helmintho-sporium Blattflecken[3]	
Sortiment mittelfrüh (geeignet für Anbauzonen 1 bis 3) – FAO 220-250															
LG 30.218	H(z)	Limagrain	2010	+	++	++	+	+++	+	++	Ø	++	++	+	10,0
SY Pracht	Z(h)	Syngenta	2015	++	++	+	+	+++	+	++	++	+	++	+	9,0
Amadeo	H(z)	KWS	2006	-	++	+++	++	+++	+	++	Ø	++	+	Ø	10,0
P7631	H(z)	Pioneer	2015	+	+++	+++	+++	+++	++	++	++	++	++	+	10,0
Kubitus	H(z)	KWS	2015	+	+++	++	++	+++	+	++	+	++	+	+	9,0
LG 30.248	H(z)	Limagrain	2015	+++	++	Ø	++	+++	+	++	Ø	++	+	+	9,5
Ricardinio[1]	H(z)	KWS	2010	++	+	++	+	+++	+	++	+	++	+	-	9,0
Messago	H(z)	Advanta (LG)	2013	+	+++	++	++	+++	+	Ø	Ø	++	++	+	10,0
Colisee	H(z)	KWS	2013	+	++	++	++	+++	+	++	++	++	+	+	9,0
Gottardo KWS[1]	H(z)	KWS	2014	+++	+++	++	++	+++	+	+	++	++	++	+	9,5
SY Talisman[1]	**Z(h)**	**Syngenta**	**2016**	**+++**	**+++**	**+++**	**++**	**+++**	**+**	**++**	**+**	**++**	**+**	**(+++)**	**8,5**
LG 30.223	H(z)	Limagrain	2012	+	++	+	++	++	+	++	+	++	++	+	10,0
LG 30.215	H(z)	Limagrain	2015	++	+++	+++	++	++	++	+	+	++	++	+	9,5
Juvento	H(z)	KWS	2015	++	++	+	+	++	++	++	+	++	+	Ø	9,0
DKC 3440	H(z)	Monsanto	2015	++	++	++	++	++	+	++	+	++	++	+	10,0

[1] Als Köner- und Silomais geeignet.

[2] Die Kolonne mit der Information über Resistenz gegen Kopfbrand wurde gelöscht (keine Boniturresultate mehr verfügbar). Die neueren Sorten der Liste sind resistent gegen Kopfbrand und ältere, anfällige Sorten gelangen nur mit speziell gegen Kopfbrand gebeiztem Saatgut in de Handel.

[3] Siehe Erklärung Textteil Seite 2. (xy) = Werte aufgrund einjähriger Datengrundlage noch nicht definitiv.

Leere Zellen: Keine Wertefür eine Beurteilung verfügbar.
Korntyp: H = Hartmais; H(z) = hartmaisähnlicher Zwischentyp; Z = Zahnmais; Z(h) = zahnmaisähnlicher Zwischentyp.
Übrige Eigeschaften: +++ =sehr gut; ++ = gut; + = mittel bis gut; Ø = mittel; - = mittel bis schwach; -- = schwach; --- = sehr schwach/spät

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Agroscope

swiss granum

Silomaissorten für die Ernte 2016

Geordnet nach der Frühreife innerhalb der Reifegruppe aufgrund des TS-Gehaltes der Pflanze zum Zeitpunkt der Ernte

Sortenname	Korntyp	Züchter	Aufnahmejahr	Trocken-substanz-ertrag	Verdau-lichkeit	Stärke-gehalt	Netto-Energie Laktation (NEL)	Reife (ganze Pflanze)	Jugendent-wicklung	Standfestigkeit			Resistenz[2]		Empf. Bestandes-dichte (Pfl./m²)
										Vegetation	bei Ernte	Stängelbruch bei Ernte	Beulenbrand	Helmintho-sporium Blattflecken[3]	
P8200	H(z)	Pioneer	2015	++	+	+	Ø	++	++	++	+	++	++	Ø	9,5
Millesim	H(z)	KWS	2012	Ø	+++	+++	++	++	+	++	Ø	++	Ø	Ø	9,0
Frederico KWS	**H(z)**	**KWS**	**2016**	**++**	**++**	**+++**	**++**	**++**	**+**	**++**	**++**	**- - -**	**++**	**(++)**	**9,0**
P8025	H(z)	Pioneer	2014	++	+	+	Ø	++	++	++	+	++	++	+	9,0
LG 30.224	H(z)	Limagrain	2013	++	++	+	++	++	+	+	Ø	++	++	+	10,0
DKC 3531	H(z)	Monsanto	2014	+	+++	+	+++	+	+	++	+	++	++	-	10,0
Fox	H	DSP	2013	++	++	+	+	+	+	++	Ø	++	+	Ø	9,5
Ceresia	H	DSP	2011	+	++	+	+	+	+	Ø	Ø	++	++	+	9,5
Xxilo	H(z)	RAGT	2015	+++	Ø	-	-	+	+	++	Ø	++	+	+	9,0
Geoxx	H(z)	RAGT	2012	++	+	+	Ø	+	+	++	-	++	++	+	9,0
ES Albatros[1]	H(z)	Euralis	2014	+++	++	+	+	+	+	+	+	++	++	+	9,0

[1] Als Köner- und Silomais geeignet.

[2] Die Kolonne mit der Information über Resistenz gegen Kopfbrand wurde gelöscht (keine Boniturresultate mehr verfügbar). Die neueren Sorten der Liste sind resistent gegen Kopfbrand und ältere, anfällige Sorten gelangen nur mit speziell gegen Kopfbrand gebeiztem Saatgut in de Handel.

[3] Siehe Erklärung Textteil Seite 2. (xy) = Werte aufgrund einjähriger Datengrundlage noch nicht definitiv.

Leere Zellen: Keine Wertefür eine Beurteilung verfügbar.
Korntyp: H = Hartmais; H(z) = hartmaisähnlicher Zwischentyp; Z = Zahnmais; Z(h) = zahnmaisähnlicher Zwischentyp.
Übrige Eigeschaften: +++ =sehr gut; ++ = gut; + = mittel bis gut; Ø = mittel; - = mittel bis schwach; -- = schwach; --- = sehr schwach/spät

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Agroscope

swiss granum

Silomaissorten für die Ernte 2016

Geordnet nach der Frühreife innerhalb der Reifegruppe aufgrund des TS-Gehaltes der Pflanze zum Zeitpunkt der Ernte

Sortenname	Korntyp	Züchter	Aufnahmejahr	Trocken-substanz-ertrag	Verdau-lichkeit	Stärke-gehalt	Netto-Energie Laktation (NEL)	Reife (ganze Pflanze)	Jugendent-wicklung	Standfestigkeit			Resistenz[2]		Empf. Bestandes-dichte (Pfl./m²)
										Vegetation	bei Ernte	Stängelbruch bei Ernte	Beulenbrand	Helmintho-sporium Blattflecken[3]	
Sortiment mittelspät (geeignet für Anbauzonen 1 und 2) – FAO 250-280															
Agro Polis	**H(z)**	**KWS**	**2016**	**+**	**+++**	**+++**	**+++**	**+++**	**Ø**	**+**	**++**	**Ø**	**++**	**(++)**	**9,0**
P8609[1]	Z(h)	Pioneer	2014	+	++	++	+++	+++	Ø	++	++	++	++	++	9,0
P8488	Z(h)	Pioneer	2013	+	Ø	-	Ø	+++	Ø	++	++	+	++	++	8,5
Kandis	H(z)	KWS	2013	Ø	+	+	+	++	+	++	-	+	++	+	8,5
NK Silotop	Z(h)	Syngenta	2010	Ø	+++	++	++	++	+	++	+	+	++	+	8,5
Figaro[1]	**H(z)**	**KWS**	**2016**	**++**	**++**	**Ø**	**+**	**+**	**+**	**++**	**++**	**++**	**++**	**(++)**	**9,0**
LG 30.306	Z	Limagrain	2015	+++	-	Ø	Ø	Ø	+	+	-	+	++	-	8,5
Quincey	Z(h)	Limagrain	2015	++	+	+	+	Ø	+	++	++	++	+	++	9,5
Walterinio KWS	**H(z)**	**KWS**	**2016**	**+++**	**+++**	**++**	**+++**	**-**	**+**	**++**	**+**	**- -**	**+**	**(+)**	**8,5**
Palmer	Z	Advanta (LG)	2014	+++	Ø	Ø	Ø	-	+	+	Ø	++	++	++	9,0
Indexx	H(z)	RAGT	2013	++	++	++	+	-	+	++	+	++	++	Ø	8,5
ANBAU SÜDLICH DER ALPEN															
Sortiment mittelfrüh (geeignet für Anbaulagen bis 700 m ü.M.) – FAO 270-400															
P1758	H(z)	Pioneer	2014	+++	++	++	++	+	+		+	++	+	++	7,8