Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie,
de la formation et de la recherche DEFR
Agroscope

swiss granum

Variétés de MAÏS GRAIN pour la récolte 2016

Dans l'ordre de précocité, d'après l'humidité du grain le jour de la récolte

Nom de la variété	Type de grain	Obtenteur	Année d'inscription	Rendement en grain	Précocité relative au groupe	IPU (indice PUFA)[2]	Vigueur au départ végétation	Résistance à la verse racinaire			Résistance[3]			Densité recommandée (pl/m²)
								en végétation	à la récolte	plantes cassées à la récolte	charbon commun	verse fusariose	Helmintho-sporiose	
NORD DES ALPES														
Groupe très précoce et précoce (adapté aux zones de culture 1 à 4) – Groupe de précocité FAO 170-210														
Laurinio	H(z)	KWS	2011	++	+++	élevé	Ø	-	++	Ø	+	++	+	9,5
KWS Stabil	H(z)	KWS	2015	+++	+++	élevé	Ø	Ø	++	++	+	Ø	+	8,5
ES Eurojet	H	Euralis	2014	+++	++	très élevé	+	++	++	+	Ø	++	++	8,5
LG 31.211[1]	**H(z)**	**Limagrain**	**2016**	**+++**	**+**	**moyen**	**+**	**++**	**++**	**+**	**+**	**+**	**(Ø)**	**9,0**
Wifaxx	H(z)	RAGT	2014	++	+	moyen	Ø	++	++	+	+	Ø	+	9,5
LG 30.222[1]	H(z)	Limagrain	2011	+++	Ø	moyen	+	++	++	+	+	++	+	9,5
SL Silvano	H(z)	Saatbau Linz	2011	++	Ø	bas	+	++	++	++	+	+	Ø	9,0
Groupe mi-précoce (adapté aux zones de culture 1 à 3) – Groupe de précocité FAO 210-230														
NK Cooler	H(z)	Syngenta	2011	++	+++	élevé	+	+	Ø	++	++	++	++	9,0
SY Talisman[1]	**Z(h)**	**Syngenta**	**2016**	**+++**	**+++**	**moyen**	**+**	**++**	**+**	**++**	**+**	**+**	**(+++)**	**8,5**
Ricardinio[1]	H(z)	KWS	2009	+	++	moyen	+	++	++	Ø	+	-	-	9,0
ES Albatros[1]	H(z)	Euralis	2014	++	++	moyen	+	++	++	+	++	+	+	8,5
Hoxxmann	Z(h)	RAGT	2015	++	++	moyen	+	+	+	+	+	++	+	9,0
Quattro	Z(h)	DSP	2015	+	+	moyen	+	+	+	++	++	++	-	9,0
Figaro[1]	**H(z)**	**KWS**	**2016**	**+++**	**+**	**moyen**	**+**	**++**	**++**	**++**	**++**	**++**	**(++)**	**9,0**
Farmoso	H(z)	FarmSaat	2011	+	Ø	très élevé	+	++	+	-	++	++	+	9,0

[1] Se prête à une utilision ensilage et grain.

[2] Voir les explications à la page 1 du texte.

[3] La colonne du charbon des inflorescences a été supprimée par manque d'information. De plus, la plupart des variétés actuelles sont résisantes à cette maladie qui peut aussi être combattue par taitement des semences.

[4] Voir les explications à la page 2 du texte. (xy) = donnée encore provisoire sur la base de résultats annuels

Cases vides: aucune valeur disponible pour une appréciation.
Type de grain: H = maïs corné; H(z) = maïs corné de type intermédiaire; Z(h) = maïs denté de type intermédiaire; Z = maïs denté
Définition des caractéristiques agronomiques: +++ = très bon / précoce; ++ = bon; + = moyen à bon; Ø = moyen; - = moyen à faible; -- = faible; --- = très faible / tardif

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie,
de la formation et de la recherche DEFR
Agroscope

Variétés de MAÏS GRAIN pour la récolte 2016

Dans l'ordre de précocité, d'après l'humidité du grain le jour de la récolte

Nom de la variété	Type de grain	Obtenteur	Année d'inscription	Rendement en grain	Précocité relative au groupe	IPU (indice PUFA)[2]	Vigueur au départ végétation	Résistance à la verse racinaire			Résistance[3]			Densité recommandée (pl/m²)
								en végétation	à la récolte	plantes cassées à la récolte	charbon commun	verse fusariose	Helmintho-sporiose	
Groupe mi-tardif (adapté aux zones de culture 1 à 2) – Groupe de précocité FAO 230-270														
DKC 3420	Z	Dekalb	2005	++	+++	moyen	Ø	++	++	++	Ø	++	++	9,0
DKC 3441	Z	Monsanto	2015	++	+++	moyen	Ø	++	++	++	Ø	+	++	9,0
Kompetens[1]	H(z)	KWS	2015	++	+++	élevé	Ø	++	++	++	++	++	++	9,0
Sixxtus	Z(h)	RAGT	2013	+++	++	moyen	+	+	++	Ø	+	Ø	+	9,0
LG 32.58	H(z)	Limagrain	2010	++	++	moyen	+	+	+	+	++	+	+	9,0
Gottardo KWS[1]	H(z)	KWS	2014	+++	++	bas	+	++	++	+	+	+	+	9,5
P8609[1]	Z(h)	Pioneer	2014	+++	+	moyen	Ø	+	++	Ø	+	++	++	9,0
P9027	Z	Pioneer	2014	+++	Ø	bas	+	++	++	Ø	+	+	++	9,0
Grosso	H(z)	KWS	2011	++	Ø	élevé	+	++	++	+	+	++	++	9,0

[1] Se prête à une utilision ensilage et grain.

[2] Voir les explications à la page 1 du texte.

[3] La colonne du charbon des inflorescences a été supprimée par manque d'information. De plus, la plupart des variétés actuelles sont résisantes à cette maladie qui peut aussi être combattue par taitement des semences.

[4] Voir les explications à la page 2 du texte. (xy) = donnée encore provisoire sur la base de résultats annuels

Cases vides: aucune valeur disponible pour une appréciation.
Type de grain: H = maïs corné; H(z) = maïs corné de type intermédiaire; Z(h) = maïs denté de type intermédiaire; Z = maïs denté
Définition des caractéristiques agronomiques: +++ = très bon / précoce; ++ = bon; + = moyen à bon; Ø = moyen; - = moyen à faible; -- = faible; --- = très faible / tardif

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie,
de la formation et de la recherche DEFR
Agroscope

Variétés de MAÏS GRAIN pour la récolte 2016

Dans l'ordre de précocité, d'après l'humidité du grain le jour de la récolte

Nom de la variété	Type de grain	Obtenteur	Année d'inscription	Rendement en grain	Précocité relative au groupe	IPU (indice PUFA)[2]	Vigueur au départ végétation	Résistance à la verse racinaire			Résistance[3]			Densité recommandée (pl/m²)
								en végétation	à la récolte	plantes cassées à la récolte	charbon commun	verse fusariose	Helmintho-sporiose	
SUD DES ALPES														
Groupe mi-précoce (jusqu'à 500 m) – Groupe de précocité FAO 270-400														
Maxxis	Z	RAGT	2007	+++	+	bas	++	++	++	+	++	++	+++	7,5
Kassandras	Z	KWS	2013	+++	+	très bas	++	+	+	++	++	++	++	7,0
PR37N01	Z	Pioneer	2010	++	+	bas	++	++	+	+	++	++	+++	7,0
Labeli CS	Z	Caussade	2011	++	Ø	bas	++		+	+	++	++	+++	9,0
Groupe mi-tardif (jusqu'à 400 m) – Groupe de précocité FAO 400-550														
PR35F38	Z	Pioneer	2011	++	++	bas	++		++	+	++	++	++	7,5
P0725	Z	Pioneer	2013	++	+	bas	++	++	++	+	++	++	+++	8,0
KWS 2373	Z	KWS	2015	+++	+	moyen	++	++	++	+	++	++	+	8,0
PR34B39	Z	Pioneer	2010	+++	Ø	bas	++		++	+	++	++	+++	7,0

[1] Se prête à une utilision ensilage et grain.

[2] Voir les explications à la page 1 du texte.

[3] La colonne du charbon des inflorescences a été supprimée par manque d'information. De plus, la plupart des variétés actuelles sont résisantes à cette maladie qui peut aussi être combattue par taitement des semences.

[4] Voir les explications à la page 2 du texte. (xy) = donnée encore provisoire sur la base de résultats annuels

Cases vides: aucune valeur disponible pour une appréciation.
Type de grain: H = maïs corné; H(z) = maïs corné de type intermédiaire; Z(h) = maïs denté de type intermédiaire; Z = maïs denté
Définition des caractéristiques agronomiques: +++ = très bon / précoce; ++ = bon; + = moyen à bon; Ø = moyen; - = moyen à faible; -- = faible; --- = très faible / tardif