

Liste der empfohlenen Sommerweizensorten für die Ernte 2017

Klasse	TOP			I		
Sorte	FIORINA*	CHASSERAL	DIGANA	ALTARE	CH CAMPALA	
Aufnahmejahr	2001	2013	2012	2013	2009	
Ertrag (Extenso)	∅	+	+(+)	+++	+(+)	
Frühreife / Ährenschieben	ms	ms	f	mf	sf	
Pflanzenlänge	mk	ml	m	mk	m	
Standfestigkeit	+++	+++	++	+++	+++	
Resistenz	Mehltau	+(+)	+	∅	+	
	Gelbrost	+	++	+	+	
	Braunrost	--	-	---	∅	---
	<i>Septoria nodorum</i> Blatt	∅	∅	-	+	∅
	<i>Septoria nodorum</i> Ähre	+	+	∅	∅	-
	Fusarien Ähre	+	+(+)	∅	∅	∅
	Auswuchs	+(+)	+	+	+(+)	∅
Proteingehalt	+++	+++	+++	++	++	
Zeleny	+	+++	++(+)	++	++	
Feuchtgluten	+	++	++	+	∅	
Hektolitergewicht	+(+)	+	+(+)	+(+)	++(+)	
Tausendkorngewicht	mittel	klein	mittel	mittel	gross	

Die Sortenbeschreibung basiert auf zwei- bis dreijährigen Durchschnittsergebnissen aus dem Versuchsnetz von Agroscope und DSP. Diese Angaben können in Abhängigkeit von Standort und klimatischen Bedingungen des Jahres variieren.

* kann im Herbst ausgesät werden, die Qualität ist leicht tiefer.

Legende:

+++ = sehr gut
 ++ = gut
 + = mittel bis gut
 ∅ = mittel
 - = mittel bis schwach
 -- = schwach
 --- = sehr schwach

Frühreife:
 sf = sehr früh; f = früh; mf = mittelfrüh; ms = mittelfspät; s = spät

Pflanzenlänge:
 sk = sehr kurz; k = kurz; mk = mittel bis kurz; m = mittel;
 ml = mittel bis lang; l = lang; sl = sehr lang