

## Liste der empfohlenen Winterweizensorten für die Ernte 2017

Klasse	TOP									I						II					Futterweizen				Biskuit			
Sorte	MOLINERA <sup>£</sup>	RUNAL	LORENZO	SIALA	TITLIS	CH CLARO	CH NARA	CH CAMEDO	ARNOLD <sup>£</sup>	ARINA	ZINAL	FOREL	SIMANO <sup>f</sup>	CH COMBIN <sup>£</sup>	CHAUMONT <sup>f</sup>	SURETTA	HANSWIN	RAINER	LUDWIG	LEVIS	BERNSTEIN	MONTALTO	BOCKRIS	MULAN	PAPAGENO	SAILOR	CAMBRENA	
Aufnahmejahr	2013	1995	2013	2006	1996	2009	2010	2011	2015	1981	2003	2008	2012	2010	2014	2011 (letztes Jahr)	2015	2011	2004	1997	2016 (prov.)	2016 (prov.)	2011	2007	2012	2015	2011	
Ertrag (Extenso) <sup>1</sup>	-(-)	-(-)	-(-)	-	-	Ø	+	Ø	Ø	-	Ø	-	Ø	++	++	Ø	+(+)	++(+)	++	+	++	+++	++++	++++	+++(+)	++++	++	
Ertrag (ÖLN) <sup>2</sup>	--	--	--	Ø	--	+	-(-)	Ø	Ø	--	Ø	+	+	+(+)	+(+)	Ø	+	++	++	+(+)	++	++	++++	+++	++++	++++	+++	
Frühreife / Ährenschieben <sup>1</sup>	mf	ms	ms	f	s	mf	mf	ms	sf	s	f	mf	sf	f	sf	f	ms	ms	ms	ms	s	ms	s	ms	s	s	ms	
Pflanzenlänge <sup>1</sup>	k	m	mk	k	ml	mk	sk	k	sl	sl	mk	m	k	sk	ml	k	m	ml	sl	k	l	m	ml	m	m	ml	mk	
Standfestigkeit <sup>1</sup>	+++	+++	++(+)	+++	++	+++	+++	++(+)	-	Ø	++	+++	+++	+++	+(+)	+++	++(+)	+	+	+++	+++	+++	++	++	++(+)	+++	+++	
Resistenz	Mehltau <sup>1</sup>	Ø	+(+)	Ø	+	Ø	+	+(+)	++	+(+)	Ø	Ø	+(+)	+	-	++	+	Ø	++	+	Ø	+(+)	+(+)	+	+	+++	++	Ø
	Gelbrost <sup>1</sup>	+	+	+	+	++	-	++	++(+)	+	Ø	+	Ø	+	+	+(+)	++	+	+	+	+	++(+)	++(+)	-	+	--	Ø	++
	Braunrost <sup>1</sup>	-(-)	--	Ø	--	-	-	+	-	-	--(-)	-	--(-)	+	-	Ø	--	-	-	-(-)	-(-)	+	Ø	-	--	-(-)	-	Ø
	Septoria nodorum Blatt <sup>1,3</sup>	+	-	Ø	-	Ø	-	+	+	Ø	-	Ø	-	-	+	-	-	+	-	Ø	+	+	+	Ø	Ø	Ø	-	+
	Septoria nodorum Ähre <sup>1,3</sup>	+	Ø	Ø	Ø	Ø	-	+	+	Ø	++	Ø	Ø	--	--	--	-	Ø	--	++	-	++	Ø	Ø	+	++	++	--
	Septoria tridici Blatt <sup>1,3</sup>	-	-	Ø	Ø	+	Ø	Ø	+	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	++	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
	Fusarien Ähre <sup>1,3</sup>	+	Ø	Ø	Ø	+	Ø	Ø	-	+	++	Ø	Ø	+	Ø	+	Ø	+	+	+	Ø	Ø	Ø	-	Ø	Ø	Ø	Ø
Auswuchs <sup>1</sup>	Ø	+(+)	+(+)	Ø	+	-	+	+	Ø	Ø	+	+	+	+	+(+)	Ø	+	Ø	+	Ø	+(+)	-	Ø	--	+(+)	Ø	Ø	
Proteingehalt <sup>1</sup>	++(+)	++(+)	++(+)	+(+)	++(+)	++	++(+)	+(+)	++	++	+(+)	+	++(+)	+	+	++(+)	+	Ø	--	+	-	-	--	--	---	-	Biskuitqualität	
Zeleny <sup>1</sup>	++(+)	+(+)	+++	+	++	+	++(+)	+	++	+	+	++	+	+	Ø	+(+)	+	+	Ø	+(+)	+	+	Futterqualität				Biskuitqualität	
Hektolitergewicht <sup>1</sup>	+(+)	++	++	++	++	+(+)	+++	+	+++	+++	+++	+++	++	+	+(+)	+	+++	+	+	++	++(+)	Ø	-	-(-)	++	++	+	
Tausendkorngewicht <sup>1</sup>	mittel	mittel	tief	mittel	gross	tief	tief	tief	tief	mittel	tief	sehr tief	mittel	sehr gross	mittel	tief	gross	gross	sehr gross	mittel	gross	mittel	gross	mittel	tief	gross	sehr tief	



## Liste der empfohlenen Winterweizensorten für die Ernte 2017

1,2 Die Sortenbeschreibung basiert auf zwei- bis dreijährigen Durchschnittsergebnissen aus dem Versuchsnetz von Agroscope und DSP (1), ergänzt durch Versuchsergebnisse für den Ertrag aus Anbauversuchen unter Bedingungen für den ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN) (2). Obige Angaben können in Abhängigkeit von Standort und klimatischen Bedingungen des Jahres variieren. Die Beurteilung des Ertrags ist nur zulässig innerhalb des gleichen Anbauverfahrens (innerhalb der gleichen Zeile); ein Vergleich zwischen den Anbauverfahren Extenso und ÖLN ist in obiger Darstellung nicht zulässig

<sup>3</sup> Nur fünf Beurteilungsklassen (++, +, Ø, – und – –)

£ Sorte mit begrannten Ähren

### Legende:

++++ = hervorragend (Diese Beurteilungsklasse gibt es nur beim Ertrag.)

+++ = sehr gut

++ = gut

+ = mittel bis gut

Ø = mittel

- = mittel bis schwach

-- = schwach

--- = sehr schwach

### Frühreife:

sf = sehr früh; f = früh; mf = mittelfrüh; ms = mittelfspät; s = spät

### Pflanzenlänge:

sk = sehr kurz; k = kurz; mk = mittel bis kurz; m = mittel;

ml = mittel bis lang; l = lang; sl = sehr lang